

BÖBREK BİYOPSİSİ	
İlk başvuru anı biyopsi endikasyonları	<ul style="list-style-type: none">• Tipik olmayan yaş: <2 yıl veya >12 yıl• Öncesinde böbrek hastalığı öyküsü• Öncesinde geçirilmiş enfeksiyon olmaması• Enfeksiyonla eş zamanlı başlangıç• Kronik böbrek hastalığı bulgularının olması• Sistemik hastalık düşündüren bulguların olması• Anüri• Nefrotik düzeyde proteinüri• Böbrek fonksiyonlarında hızlı bozulma• Normal serum kompleman C3 düzeyi
İzlemde biyopsi endikasyonları	<p>Bulgularda beklenen düzelleme zamanı;</p> <ul style="list-style-type: none">• Oligüri/azotemia >2 hafta• GFH düşüklüğü >4-6 hafta• Uzamış hipertansiyon >2-3 hafta• Makroskopik hematüri >4 hafta• C3 düşüklüğü >8-12 hafta• Hafif / orta proteinüri > 6 ay
Biyopsi sonrası takip	<ul style="list-style-type: none">• 6 saat yüzüstü, 24 saat sırt üstü yatarak izlem• Tüm idrarların ayrı kapta takibi• 2 saat oral kapalı izlem• Hidrasyonun ayarlanması (ort. 2500 cc/m²)• İlk 1 saat 15 dk, 1-2 saat 30 dk, 4 saat sonunda saatlik vital takip• Biyopsi yerinin takibi• İdrar çıkarmında azalma veya 6 saat boyunca idrar olmaması• Makroskopik hematüri takibi• Biyopsiden 2-4 saat sonra hemogram kontrolü• Biyopsi sonrası 2-3 hafta temaslı aktivitelerden kaçınma