

Tablo 1: STAT3 skortlama sistemi

| | Puanlar | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------|-----|-----|---|----|
| | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Klinik bulgular | | | | | | |
| Pnömoni (Röntgen ile kanıtlanmış) | 0 | 1 | 2 | - | 3 | >3 |
| Yenidoğan döneminde raş | Yok | - | Var | - | - | - |
| Minör travma ile kemik kırıkları | 0 | - | 1-2 | - | - | >2 |
| Job sendromu için karakteristik yüz | Yok | Hafif | - | Var | - | - |
| Yüksek damak | Yok | Var | - | - | - | - |

| | Puan | X | Skala | Skala puanı |
|-------------------------------------|------|---|-------|-------------|
| Pnömoni | | | 2.5 | |
| Yenidoğan döneminde raş | | | 2.08 | |
| Minör travma ile kemik kırıkları | | | 3.33 | |
| Job sendromu için karakteristik yüz | | | 3.33 | |
| Yüksek damak | | | 2.5 | |
| Total skala puanı | | | | |

Total skor >30 STAT3 eksikliği düşün

Tablo 2: DOCK8 skrolama sistemi

| | | Özellikler | Puan x Skala | | Skala puanları | |
|----|--|-----------------------------------|--------------|---|----------------|--------|
| 1. | Zorunlu: IgE> 10x normal deęer | | | | | |
| 2. | A. | Parankimal akcięer anormallikleri | Yok | 0 | -5.00 | 0.00 |
| | | | Bronęektazi | 6 | -5.00 | -30.00 |
| | | | Pnömatosel | 8 | -5.00 | -40.00 |
| | B. | En yüksek eozinofil sayısı/µl | < 700 | 0 | 8.18 | 0.00 |
| | | | 701-800 | 3 | 8.18 | 24.54 |
| | | | >800 | 6 | 8.18 | 49.08 |
| | C. | Sinüzit, otit /yıl | 1-2 | 0 | 15.50 | 0.00 |
| | | | 3 | 1 | 15.50 | 15.50 |
| | | | 4-6 | 2 | 15.50 | 31.00 |
| | | | >6 | 4 | 15.50 | 62.00 |
| | D. | Süt diřlerinin düşmesinde gecikme | Yok | 0 | -4.54 | 0.00 |
| | | | 1 | 1 | -4.54 | -4.54 |
| | | | 2 | 2 | -4.54 | -9.08 |
| | | | 3 | 4 | -4.54 | -18.16 |
| | | | >3 | 8 | -4.54 | -36.32 |
| | E. | Minör travma ile kemik kırıkları | 0 | 0 | -9.09 | 0.00 |
| | | | 1-2 | 4 | -9.09 | -36.36 |
| | | | >2 | 8 | -9.09 | -72.72 |
| | Total skala deęeri | | | | | |

Total skor >30 DOCK8 eksikligi dusun

Tablo 3: HIES skorumlama sistemi

| Klinik bulgular | Puan | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|--------|---------|-----------|---------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| En yüksek IgE [IU/ml] | <200 | 200-500 | | | 501-1,000 | | | | 1,001-2,000 | >2,000 |
| Cilt absesi (total #) | yok | | | | 3-4 | | | | >4 | |
| Pnömoni (Röntgen ile kanıtlanmış, total #) | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | >3 | |
| Parenkimal Akciger anormalligi | yok | | | | | | bronşektazi | | pnomatosek | |
| Diğer ciddi infeksiyonlar | yok | | | | ağır | | | | | |
| öldürücü infeksiyon | yok | | | | var | | | | | |
| En yüksek eozinofil sayısı/ul | <700 | | | 700-800 | | | >800 | | | |
| Yenidoğan döneminde raş | yok | | | | var | | | | | |
| Egzema | yok | hafif | orta | | ağır | | | II | | |
| Sinüzit, otit (# total/yıl) | 1-2 | 3 | 4-6 | | >6 | | | | | |
| Kandidiyazis | yok | oral, vajinal | tirnak | | systemik | | | | | |
| Süt dişlerinin düşmesinde gecikme | 0 | 1 | 2 | | 3 | | | | >3 | |
| Skolyoz | <10° | | 10-14° | | 15-20° | | | | >20° | |
| Küçük travmalar ile kemik kırıkları | 0 | | | | 1-2 | | | | >2 | |
| Hiperektansibilite | yok | | | | var | | | | | |
| Karakteristik yüz | yok | | hafif | | | var | | | | |
| Burun kökü genişliğinde artış | <1 SD | 1-2 SD | | >2 SD | | | | | | |
| Yüksek damak | yok | | var | | | | | | | |
| Orta hat anomalisi | yok | | | | | var | | | | |
| Lenfoma | yok | | | | var | | | | | |
| Küçük yaş | >5 yaş | | | 2-5 yaş | | 1-2 yaş | | <1 yaş | | |